

10N007_大腸_FOLFIRI (末梢) I-LV Day1投与方法

I-LV (Day 1) + FU (Day 1・2) + CPT-11 (Day 1) 2週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div(メイン) / 30min		●						
2 ブドウ糖注 5% (250mL) イリノテカン塩酸塩注	1 袋 _____ mg [120-150mg/m2]	div(メイン) / 2hr I-LVと同時		○						
3 ブドウ糖注 5% (250mL) レボホリナート注	1 袋 _____ mg [I-LV 200mg/m2]	div(側管) / 2hr CPT-11と同時		●						
4 生食注 (50mL) 5-FU注	1 瓶 _____ mg [400mg/m2]	div(メイン) / 全開		○						
5 ハルトマン液PH:8 (1リットル) 5-FU注	1 袋 _____ mg [1200-1500mg/m2]	div(メイン) / 23hr		○	○					
6 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / (フラッシュ)					●			