

## 23N026\_子宮頸\_KEY + Bev

Pembrolizumab ( Day 1 ) + Bevacizumab ( Day 1 ) 3週毎 29コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆ 免疫チェックポイント阻害薬カンファレンス前検査はすべて実施しましたか? → ( はい ・ いいえ )

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 15min		●						
2 生食注 ( 100mL ) キイトルーダ点滴静注	1 瓶 200 mg [ 200mg/body ]	div / 30min		○						
3 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 15min		●						
4 生食注 ( 100mL ) アバスチン点滴	1 瓶 _____ mg [ 15mg/kg ]	div / ※ 1.5hr		○						
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						

① キイトルーダ注の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2~0.22  $\mu$  m)を使用すること。

② キイトルーダ注希釈後の濃度は、1~10mg/mLとなること。

※ アバスチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。