

42N014_R-THP-COP (ML1)

Rituximab (Day 1) + CPA (Day 3) + THP (Day 3) + VCR (Day 3) + Prednisolone (Day 3 - 7) 3週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

◇ ML1 : PS 0~3 かつ、Alb 3.0g/dL 以上

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

| Rp. 商品名 | 用量 [基準量] | 投与方法 | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 カロナール錠 200mg | 3 Tab | po / リツキシマブ投与30分前 | | ● | | | | | | |
| 2 生食注 (100mL) ボラミン注5mg | 1 瓶 1 A | div / 30min | | ● | | | | | | |
| 3 テルモ生食 (500mL) リツキシマブBS点滴静注 | 1 袋 _____ mg [375mg/m2] | div / ※別表に従う | | ○ | | | | | | |
| 4 生食注 (50mL) | 1 瓶 | div / フラッシュ | | ● | | | | | | |
| 5 グラニセトロン点滴3mgバッグ | 1 袋 | div / 30min | | | | ● | | | | |
| 6 生食注 (50mL) オンコピン注射用 | 1 瓶 _____ mg [1mg/m2] ※ Max 2.0mg/body | div / 15min | | | | ○ | | | | |
| 7 ブドウ糖注 5% (100mL) テラルピシン注射用 | 1 瓶 _____ mg [70~79歳 40mg/m2] [80歳以上 30mg/m2] | div / 30min | | | | ○ | | | | |
| 8 ソルデム3A (500mL) 注射用エンドキサン | 1 袋 _____ mg [70~79歳 650mg/m2] [80歳以上 400mg/m2] | div / 3hr | | | | ○ | | | | |
| 9 生食注 (50mL) | 1 瓶 | div / フラッシュ | | | | ● | | | | |
| 10 プレドニゾロン錠 | _____ mg [70~79歳 40mg/m2] [80歳以上 30mg/m2] | po | | | | ● | ● | ● | ● | ● |

- 必要時、グラニセトロンバッグにデカドロン注を追加。
- hydration処方が必要な時、別オーダーとする。