

42N015_R-THP-COP (ML2)

Rituximab (Day 1) + CPA (Day 3) + THP (Day 3) + VCR (Day 3) + Prednisolone (Day 3 - 7) 3週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

◇ ML2 : PS 4 または、Alb 3.0g/dL 未満

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 カロナール錠 200mg	3 Tab	po / リツキシマブ投与30分前		●						
2 生食注 (100mL) ボラミン注5mg	1 瓶 1 A	div / 30min		●						
3 テルモ生食 (500mL) リツキシマブBS点滴静注	1 袋 _____ mg [375mg/m ²]	div / ※別表に従う		○						
4 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
5 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 30min				●				
6 生食注 (50mL) オンコピン注射用	1 瓶 _____ mg [1mg/m ²] ※ Max 2.0mg/body	div / 15min				○				
7 ブドウ糖注 5% (100mL) テラルピシン注射用	1 瓶 _____ mg [70~79歳 26mg/m ²] [80歳以上 20mg/m ²]	div / 30min				○				
8 ソルデム3A (500mL) 注射用エンドキサン	1 袋 _____ mg [70~79歳 430mg/m ²] [80歳以上 260mg/m ²]	div / 3hr				○				
9 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ				●				
10 プレドニゾロン錠	_____ mg [70~79歳 40mg/m ²] [80歳以上 30mg/m ²]	po				●	●	●	●	●

- 必要時、グラニセトロンバッグにデカドロン注を追加。
- hydration処方が必要な時、別オーダーとする。