

42N110_IsaPd 4週毎

初回 : Isatuximab (Day 1・8・15・22) + Dexamethasone (Day 1・8・15・22) + Pomalidomide (Day 1-21) 4週毎
 2コース以降 : Isatuximab (Day 1・8・15) + Dexamethasone (Day 1・8・15・22) + Pomalidomide (Day 1-21) 4週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 レナデックス錠	_____ mg [40mg/週 (適宜減量)]	po 分1 / サークリサの実施日は サークリサ投与15分前		●						
				● Day 8 / Day 15 / Day 22						
2 コロナール錠 200mg ボラミン錠 2mg ファモチジンOD錠 20mg	3 Tab 1 Tab 1 Tab	po / サークリサ投与15分前		●						
				● Day 8 / Day 15 / Day 22 2コース以降は Day 1 と Day 15 のみ投与						
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 前投薬直後より15min		●						
				● Day 8 / Day 15 / Day 22 2コース以降は Day 1 と Day 15 のみ投与						
4 生食注 (250mL) サークリサ点滴静注	※ _____ mg [10mg/kg] (※全量 250mL とする。)	div / 投与速度は 換算表に準じる		○						
				○ Day 8 / Day 15 / Day 22 2コース以降は Day 1 と Day 15 のみ投与						
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 初回 30min 2回目以降 フラッシュ		●						
				● Day 8 / Day 15 / Day 22 2コース以降は Day 1 と Day 15 のみ投与						
6 ポマリスタCap	_____ mg [4mg/body]	po 分1								○ Day 1 - 21

※ サークリサ注は専用ルートを使用すること。