

23N027_卵巣_PTX(1・8・15) + Bev(1) 3週毎

PTX (Day 1・8・15) + Bevacizumab (Day 1) 3週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ アルコールに対する過敏症はありませんか？ → (有 , 無)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 (50mL)	1 瓶	div		●						
2 生食注 (100mL) ベバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____ mg [15mg/kg]	div / ※ 1.5hr		○						
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div		●						
4 生食注 (100mL) デカドロン注射液1.65mg ポラミン注5mg ガスター注射液20mg	1 瓶 5 A 1 A 1 A	div / 15min		●			● Day 8 / Day 15			
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 30min		●			● Day 8 / Day 15			
6 生食注 (250mL) パクリタキセル注	1 袋 _____ mg [80mg/m ²]	div / 1hr		○			○ Day 8 / Day 15			
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div		●			● Day 8 / Day 15			

※ ベバシズマブ注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。

- Rp.4 デカドロン注は忍容性良好であれば、徐々に減量可。
- パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。