

05G024_Bev(1)+CBDCA(1)+GEM(1・8) 3週毎

Bevacizumab (Day 1) + CBDCA (Day 1) + GEM (Day 1・8) 3週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 グラニセトロン点滴3mgパック アロカリス点滴静注 235mg デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 1 瓶 6 A	div / 30min		●						
2 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ)		●						
3 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 4 A	div / 15min								● Day 8
4 生食注 (100mL) ゲムシタピン注	1 瓶 _____ mg [1000mg/m ²]	div / 30min		○						○ Day 8
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ)		●						● Day 8
6 ブドウ糖注 5% (250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [AUC 5]	div / 1hr		○						
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ)		●						
8 生食注 (100mL) ペバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____ mg [15mg/kg]	div / ※ 1.5hr		○						
9 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ)		●						

※ペバシズマブ注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr), 2回目(1hr), 3回目以降(30min)で投与可。