

05N032_Atezo + Bev

Atezolizumab (Day 1) + Bevacizumab (Day 1) 3週毎 PDまで

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
2 生食注 (250mL) テセントリク点滴静注	1 袋 1200mg [1200mg/body]	div / ※1 1hr		○						
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
4 生食注 (100mL) ペバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____ mg [15mg/kg]	div / ※2 1.5hr		○						
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※1 テセントリク注は、初回の忍容性が良好ならば2回目以降は30分で投与可。

※2 ペバシズマブ注は、初回の忍容性が良好ならば2回目60分、3回目以降30分で投与可。

・テセントリク注の輸液は、生食250mL限定

・テセントリク注の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2~0.22 μ m)を使用すること。