

10G033_大腸_Bev + FOLFIRI (末梢)

Bevacizumab (Day 1) + I-LV (Day 1・2) + FU (Day 1・2) + CPT-11 (Day 1) 2週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 (100mL) ベバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____ mg [5mg/kg]	div(メイン) / ※ 1.5hr		○						
2 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / (フラッシュ)		●		●				
3 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div(メイン) / 30min		●						
4 ブドウ糖注 5% (250mL) イリノテカン塩酸塩注	1 袋 _____ mg [120-150mg/m2]	div(メイン) / 2hr I-LVと同時		○						
5 ブドウ糖注 5% (250mL) レボホリナート注	1 袋 _____ mg [I-LV 100mg/m2]	div(側管) / 2hr CPT-11と同時		●						
6 ブドウ糖注 5% (250mL) レボホリナート注	1 袋 _____ mg [I-LV 100mg/m2]	div(メイン) / 2hr				●				
7 生食注 (50mL) 5-FU注	1 瓶 _____ mg [400mg/m2]	div(メイン) / 全開		○	○					
8 ハルトマン液PH:8 (1リットル) 5-FU注	1 袋 _____ mg [600mg/m2]	div(メイン) / 22hr		○	○					

※ベバシズマブ注は忍容性良好であれば, 初回(1.5hr), 2回目(1hr), 3回目以降(30min)で投与可。