

## 20N021\_VIP

IFM ( Day 1 - 5 ) + CDDP ( Day 1 - 5 ) + VP-16 ( Day 1 - 5 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 ハロノセトロン注ハック0.75mg/50mL アロカリス点滴静注 235mg デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 1 瓶 6 A	div(メイン) / 30min		●						
2 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
3 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 6 A	div(メイン) / 15min			●	●	●			
4 ハロノセトロン注ハック0.75mg/50mL デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 6 A	div(メイン) / 15min						●		
5 生食注 ( 100mL ) ウロミテキサン注	1 瓶 _____ mg [ 240mg/m2 ]	div(側管) / 30min イホマイト投与時		●	●	●	●	●		
6 テルモ生食 ( 500mL ) 注射用イホマイト	1 袋 _____ mg [ 1200mg/m2 ]	div(メイン) / 2hr		○	○	○	○	○		
7 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●	●	●	●	●		
8 生食注 ( 250mL ) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [ 20mg/m2 ]	div(メイン) / 2hr		○	○	○	○	○		
9 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●	●	●	●	●		
10 生食注 ( 100mL ) ウロミテキサン注	1 瓶 _____ mg [ 240mg/m2 ]	div(メイン) / 30min		●	●	●	●	●		
11 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●	●	●	●	●		
12 ブドウ糖注 5% ( 500mL ) ベプシド注	1 袋 _____ mg [ 75mg/m2 ]	div(メイン) / 2hr		○	○	○	○	○		
13 ソリューゲンF注 ( 500mL ) メイロン静注7% ( 20mL )	1 袋 1 A	div(メイン) / 2hr		●	●	●	●	●		
14 ソルデム3A ( 500mL ) メイロン静注7% ( 20mL ) ウロミテキサン注	1 袋 1 A _____ mg [ 240mg/m2 ]	div(メイン) / 2hr		●	●	●	●	●		

・ベプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。