

20N004_BEP

BLM (Day 2・9・16) + VP-16 (Day 1-5) + CDDP (Day 1-5) 3週毎 2~4コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

| Rp. 商品名 | 用量 [基準量] | 投与方法 | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------------------|-----------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ソルデム3A (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 6hr | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 2 YDソリター-T1号 (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 6hr | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 3 YDソリター-T1号 (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 6hr | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 4 ソルデム3A (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 6hr | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 5 パロセトロン注ハッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注 235mg デカドロン注射液1. 65mg | 1 袋 1 瓶 6 A | div(側管) / 30min | | ● | | | | | | |
| 6 生食注 (50mL) | 1 瓶 | div(側管) / 5min | | ● | | | | | | |
| 7 パロセトロン注ハッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1. 65mg | 1 袋 6 A | div(側管) / 30min | | | | | | | | ● |
| 8 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg | 1 瓶 5 A | div(側管) / 20min | | | ● | | | | | |
| 9 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg | 1 瓶 5 A | div(側管) / 30min | | | | ● | ● | | | |
| 10 生食注 (50mL) ソル・メドロール静注用125mg | 1 瓶 1 瓶 | div(メイン) / 5min | | | | | | | | ● Day 9 / Day 16 |
| 11 生食注 (50mL) プレオ注射用 | 1 瓶 30 mg [30mg/body] | div(側管※) / 5min | | | | | | | | ○ Day 9 / Day 16 ※ Day 9, Day 16 はメインルートから投与 |
| 12 生食注 (50mL) | 1 瓶 | div(側管※) / 5min | | | | | | | | ● Day 9 / Day 16 ※ Day 9, Day 16 はメインルートから投与 |
| 13 テルモ生食 (500mL) ペプシド注 | 1 袋 _____ mg [100mg/m2] | div(側管) / 2hr | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 14 生食注 (50mL) フロセミド注射液20mg | 1 瓶 1 A | div(側管) / 5min | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 15 テルモ生食 (500mL) シスプラチン注 | 1 袋 _____ mg [20mg/m2] | div(側管) / 2hr | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 16 20%マンニトール注(300mL) | 1 袋 | div(側管) / 1hr | | ● | ● | ● | ● | ● | | |

・ペプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。