

05N044_肺_Durva+Treme+CBDCA+ペトレ 3週毎

Durvalumab (Day 1) + Tremelimumab (Day 1) + CBDCA (Day 1) + Pemetrexed (Day 1) 3週毎 4コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 シアノコバラミン注1000 μ g	1 A	im								
										● Day -6 より9週毎に投与。
2 調剤用パンピタン末	1g	po / 分1								
										● Day -6 より連日投与。
3 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po / 分2	●	●	●					
4 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
5 生食注 (100mL) イジユド点滴静注	1 瓶 75 mg [75mg/body]	div(メイン) / 1hr		○						
6 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
7 生食注 (250mL) イミフィンジ点滴静注	1 袋 _____ mg [※1500mg/body]	div(メイン) / 1hr		○						
8 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
9 グラニセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注 235mg	1 袋 1 瓶	div(メイン) / 30min		●						
10 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
11 生食注 ペトレキセド点滴静注液	※ _____ mg [500mg/m ²] (全量 100mL とする。)	div(メイン) / 10min		○						
12 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / 30min		●						
13 ブドウ糖注 5% (250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [AUC 5-6]	div(メイン) / 1hr		○						
14 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						

※ イミフィンジ注は体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kg(体重)とする。

- ・ イジユド注およびイミフィンジ注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用すること。
- ・ イジユド注の希釈後の濃度は、0.1～10mg/mLとなること。
- ・ イミフィンジ注の希釈後の濃度は、1～15mg/mLとなること。

- ・ NSAIDsは5日間中止を考慮。(Day -1 ～ 3)
- ・ 大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。