

## 10N032\_臍\_mFOLFIRINOX ( リザーバー )

L-OHP ( Day 1 ) + I-LV ( Day 1 ) + CPT-11 ( Day 1 ) + FU ( Day 1 ) 2週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 ( Day 1 ) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 ヘパリンNaロック100u/mLシリンジ	1 筒	導通確認		●						
2 パロセトロン注ハック0.75mg/50mL アロカリス点滴静注 235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 6 A	メイン / 30min		●						
3 生食注 ( 50mL )	1 瓶	メイン / フラッシュ		●						
4 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) オキサリプラチン点滴静注液	1 袋 _____ mg [ 85mg/m <sup>2</sup> ]	メイン / 2hr		○						
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	メイン / 30min LVと同時に開始		●						
6 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) レボホリナート注	1 袋 _____ mg [ I-LV 200mg/m <sup>2</sup> ]	側管 / 2hr 開始30分後より CPT-11と同時に投与		●						
7 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) イリノテカン塩酸塩注	1 袋 _____ mg [ 150mg/m <sup>2</sup> ]	メイン / 1.5hr LV開始30分後より LVと同時に投与		○						
8 生食注 5-FU注	※ _____ mg [ 2400mg/m <sup>2</sup> ]	メイン / 46hr		○						
9 ヘパリンNaロック100u/mLシリンジ	1 筒	ヘパロック					●			

※ 5-FU注のリザーバー全量は薬剤部規定の希釈表に従うものとする。〈 注入時間:約46時間 〉