

## 18N002\_( 維持 ) テモダール + BEV

Bevacizumab ( Day 1・15 ) + Temozolomide ( Day 1-5 ) 4週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 ( 50mL )	1 瓶	(フラッシュ)		●				● Day 15		
2 生食注 ( 100mL ) ベバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____ mg [ 10mg/kg ]	div / ※ 1.5hr		○				○ Day 15		
3 生食注 ( 50mL )	1 瓶	(フラッシュ)		●				● Day 15		
101 テモダールCap	_____ mg [ 150mg/m <sup>2</sup> ] 2コース目以降、 基準量200mg/m <sup>2</sup> へ増量可。	po / 分1 空腹時		●	●	●	●	●		

※ ベバシズマブ注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。

※ 維持療法は、初発治療終了後28日間経過していること。