

## 06N005\_Trastuzumab + SOX

Trastuzumab ( Day 1 ) + L-OHP ( Day 1 ) + S-1 ( Day 1-14 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
2 生食注 ( 250mL ) トラスツズマブBS点滴静注用	1 袋 _____ mg [ 初回 8mg/kg ]  _____ mg [ 2回目以降 6mg/kg ]	div / ※ 1.5hr		○						
3 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
4 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 6 A	div / 15min		●						
5 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) オキサリプラチン点滴静注液	1 袋 _____ mg [ 130mg/m <sup>2</sup> ]	div / 2hr		○						
6 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
101 エスワンタイホウ配合OD錠	_____ mg [ 80mg/m <sup>2</sup> /日 ]	po / 分2(朝夕)								● Day 1 -14

※ トラスツズマブ注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目以降(30min)で投与可。