

## 05G025\_CBDCA(1) + nab-PTX(1・8・15) 3週毎

CBDCA ( Day 1 ) + nab-PTX ( Day 1・8・15 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 グラニセトロン点滴3mgパック アロカリス点滴静注 235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 3 A	div / 30min		●						
2 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div / 15min						● Day 8 / Day 15		
3 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●				● Day 8 / Day 15		
4 生食注 アブラキサン点滴静注	※ _____ mg [ 100mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○				○ Day 8 / Day 15		
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [ AUC 6 ]	div / 1hr		○						
7 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●				● Day 8 / Day 15		

※ アブラキサン注投与量が1~200mgの場合は生食50mL、201mg以上の場合は生食100mLを用いる。

- ・ アブラキサン注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用しないこと。
- ・ 特定生物由来製品 (アブラキサン) 説明書を発行して、患者へ説明すること。