

## 05N041\_肺\_Durva+Treme+CBDCA+nabPTX 3週毎

Durvalumab (Day 1) + Tremelimumab (Day 1) + CBDCA (Day 1) + nabPTX (Day 1・8・15) 3週毎 4コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
2 生食注 ( 100mL ) イジユド点滴静注	1 瓶 75 mg [ 75mg/body ]	div(メイン) / 1hr		○						
3 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
4 生食注 ( 250mL ) イミフィンジ点滴静注	1 袋 _____ mg [ 1500mg/body ] ※1	div(メイン) / 1hr		○						
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
6 グラネセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注 235mg デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 1 瓶 3 A	div(メイン) / 30min		●						
7 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
8 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 4 A	div(メイン) / 15min						● Day 8 / Day 15		
9 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(側管※3) / フラッシュ		●				● Day 8 / Day 15		
								※3 Day 8・15 はメインルートを使用		
10 生食注 アブラキサン点滴静注	※2 _____ mg [ 100mg/m2 ]	div(側管※3) / 30min		○				○ Day 8 / Day 15		
								※3 Day 8・15 はメインルートを使用		
11 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(側管※3) / フラッシュ		●				● Day 8 / Day 15		
								※3 Day 8・15 はメインルートを使用		
12 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [ AUC 5-6 ]	div(メイン) / 1hr		○						
13 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						

※1 イミフィンジ注は体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kg(体重)とする。

※2 アブラキサン注投与量が1~200mgの場合は生食50mL、201mg以上の場合は生食100mLを用いる。

・ イジユド注およびイミフィンジ注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用すること。

・ アブラキサン注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用しないこと。

・ イジユド注の希釈後の濃度は、0.1~10mg/mLとなること。

・ イミフィンジ注の希釈後の濃度は、1~15mg/mLとなること。

・ 特定生物由来製品(アブラキサン)説明書を発行して、患者へ説明すること。