

## 10G057\_臍\_GEM + nab-PTX療法

GEM ( Day 1・8・15 ) + nab-PTX ( Day 1・8・15 ) 4週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 パロセトロン注ハック0.75mg/50mL 1 袋 デカドロン注射液1.65mg 4 A		div / 15min		●				● Day 8 / Day 15		
2 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ)		●				● Day 8 / Day 15		
3 生食注 アブラキサン点滴静注	※ _____ mg [ 125mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○				○ Day 8 / Day 15		
4 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ)		●				● Day 8 / Day 15		
5 生食注 ( 100mL ) ゲムシタピン注	1 瓶 _____ mg [ 1000mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○				○ Day 8 / Day 15		
6 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ)		●				● Day 8 / Day 15		

※ アブラキサン注投与量が1~200mgの場合は生食50mL、201mg以上の場合は生食100mLを用いる。

- ・ アブラキサン注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用しないこと。
- ・ 特定生物由来製品 (アブラキサン) 説明書を発行して、患者へ説明すること。