

## 42N021\_DA-EPOCH

VP-16 ( Day 1 - 4 ) + DXR ( Day 1 - 4 ) + VCR ( Day 1 - 4 ) + CPA ( Day 5 ) + Prednisolone ( Day 1 - 5 ) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
11 バロネトロン注ハッグ0.75mg/50mL	1 袋	IVH メイン / 30min		●						
12 グラニセトロン点滴3mgハッグ	1 袋	IVH メイン / 30min						●		
13 ソルデム3A ( 500mL ) メイロン静注8.4% ( 20mL )	1 袋 1 A	IVH メイン / 12hr ★2回/日★		●	●	●	●			
14 ソルデム3A ( 500mL ) 注射用エンドキサソ	1 袋 _____ mg [ 750mg/m2 ]	IVH メイン / 3hr						○		
15 生食注 ( 50mL )	1 瓶	IVH メイン / フラッシュ						●		
16 ソルデム3A ( 500mL ) メイロン静注8.4% ( 20mL ) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	IVH メイン / 2.5hr						●		
17 ソルデム3A ( 500mL ) メイロン静注8.4% ( 20mL )	1 袋 2 A	IVH メイン / 2.5hr						●		
21 生食注 ( 50mL )	1 瓶	IVH サブ / フラッシュ			●	●	●			
22 テルモ生食 ( 500mL ) ベプシド注 ドキシソルピシン塩酸塩注 オンコピン注射用	1 袋 _____ mg [ 50mg/m2 ] _____ mg [ 10mg/m2 ] _____ mg [ 0.4mg/m2 ] ※ (VCR) Max 0.5mg/body	IVH サブ / 24hr		○	○	○	○			
23 生食注 ( 50mL )	1 瓶	IVH サブ / フラッシュ						●		
31 ブレドニゾン錠	_____ mg [ 60mg/m2 ]	po		●	●	●	●	●		

- ・G-CSFを併用。
- ・ベプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。
- ・1回目に嘔気が強かった人のみ、2回目からアプレビタントCapを追加。