

42N023_DEVIC

CBDCA (Day 1) + VP-16 (Day 1 - 3) + IFM (Day 1 - 3) + Dexamethasone (Day 1 - 3) 3週毎 6コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 パロセトロン注ハッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液	1 袋 40mg (デキサメタゾンとして)	div / 1hr		●						
2 生食注 (100mL) デカドロン注射液	1 瓶 40mg (デキサメタゾンとして)	div / 1hr			●	●				
3 テルモ生食 (500mL) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [300mg/m2]	div / 2hr		○						
4 テルモ生食 (500mL) ベブシド注	1 袋 _____ mg [100mg/m2]	div / 2hr		○	○	○				
5 生食注 (50mL) ウロミテキササン注	1 瓶 _____ mg [500mg/m2/回]	div / 30min ★3回/日★		●	●	●				
※イホマイド注の投与前, 4hr後, 8hr後 ※4hr後, 8hr後は側管を使用。										
6 テルモ生食 (500mL) 注射用イホマイド	1 袋 _____ mg [1500mg/m2]	div / 2hr		○	○	○				
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				
8 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	div / 2.5hr		●	●	●				
9 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL)	1 袋 2 A	div / 2.5hr		●	●	●				
10 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div / 翌朝まで		●	●	●				

•G-CSFを併用。

•ベブシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。