

42N052_R-MPV

Rituximab (Day 1) + VCR (Day 2) + MTX (Day 2) + Procarbazine (Day 2 - 8 ※) 2週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 カロナール錠 200mg	3 Tab	po		●						
2 生食注 (100mL) ボラミン注5mg	1 瓶 1 A	div / 30min		●						
3 テルモ生食 (500mL) リツキシマブBS点滴静注	1 袋 _____ mg [375mg/m2]	div / ※別表に従う		○						
4 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
5 ハロセトロン注ハッグ0.75mg/50mL	1 袋	div / 30min			●					
6 生食注 (50mL) オンコピン注射用	1 瓶 _____ mg [1.4mg/m2] ※ Max 2.0mg/body	div / 30min				○				
7 ソルデム3A (500mL) メソトレキセート注	1 袋 _____ mg [3500mg/m2]	div / 2hr				○				
8 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ			●					
9 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL)	1 袋 1 A	div / 4hr			●	●	●	●		
			×6 ×6 ×6 ×6				※MTX濃度0.1 μ Mになるまで 6本/日を投与			
10 生食注 (50mL) ロイコボリン注3mg	1 瓶 15mg/回	div / 全開				●	●	●		
			×4 ×4 ×4				※MTX濃度0.1 μ Mになるまで 6時間毎に投与			
11 ダイアモックス錠	250mg/回	po		●	●	●	●	●		
			×3 ×3 ×3 ×3 ×3				※MTX濃度0.1 μ Mになるまで 8時間毎に投与			
12 塩酸プロカルバジンCap	_____ mg [100mg/m2]	po								
			● Day 2 - 8 ※隔コースで実施							