

42N214_MEC (MIT + VP-16 + AraC)

MIT (Day 1 - 3) + VP-16 (Day 1 - 5) + Ara-C (Day 1 - 5) 3週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

| Rp. 商品名 | 用量 [基準量] | 投与方法 | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 1 ハロプロトン注ハッグ [®] 0.75mg/50mL | 1 袋 | CV / 30min | | ● | | | | ● | | |
| 2 生食注 (100mL) 水溶性プレドニン20mg | 1 瓶 3 A | CV / 30min | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 3 生食注 (100mL) ノバントロン注 | 1 瓶 _____ mg [6-8mg/m ²] | CV / 30min | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 4 ブドウ糖注 5% (500mL) ベプシド注 | 1 袋 _____ mg [100mg/m ²] | CV / 2hr | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 5 ブドウ糖注 5% (250mL) シタラピン注 | 1 袋 _____ mg [1000mg/m ²] | CV / 2hr | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 6 生食注 (50mL) | 1 瓶 | CV / フラッシュ | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 7 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL) フロセミド注射液20mg | 1 袋 1 A 1 A | CV / 2.5hr | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 8 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL) | 1 袋 1 A | CV(側管) / 12hr | | ● ×2 | ● ×2 | ● ×2 | ● ×2 | ● ×2 | | |

・ベプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。