

## 42N031\_R-Bendamustine

Rituximab ( Day 1 ) + Bendamustine ( Day 2・3 ) 4週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 カロナール錠 200mg	3 Tab	po / リツキシマブ投与30分前		●						
2 生食注 ( 100mL ) ボララミン注5mg	1 瓶 1 A	div / 30min		●						
3 テルモ生食 ( 500mL ) リツキシマブBS点滴静注	1 袋 _____ mg [ 375mg/m2 ]	div / ※別表に従う		○						
11 ハプロネクトン注ハッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 4 A	div / 15min			●					
12 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 4 A	div / 15min				●				
13 生食注 ( 50mL ) ベンダムスチン塩酸塩注	1 瓶 _____ mg [ 90mg/m2 ]	div(メイン) / 10min				○	○			
14 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(側管) / 10min ベンダムスチンと同時				●	●			
CVポート投与の場合、生食注(50mL)は不要。										
15 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ				●	●			
16 ソルデム3A ( 500mL ) メイロン静注8.4% ( 20mL ) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 1 A	div / 2.5hr				●	●			
17 ソルデム3A ( 500mL ) メイロン静注8.4% ( 20mL )	1 袋 2 A	div / 2.5hr				●	●			