

42N039_初回 G-Bendamustine 4週毎

Obinutuzumab (Day 1・8・15) + Bendamustine (Day 2・3) 4週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 カロナール錠 200mg	3 Tab	po / ガザイバ投与30分前		●						
					● Day 8 / Day 15					
2 生食注 (100mL) ボラミン注5mg デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 1 A 4 A	div / 30min		●						
					● Day 8 / Day 15					
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
					● Day 8 / Day 15					
4 生食注 (250mL) ガザイバ点滴静注	※ 1000 mg [1000mg/body] (全量 250mL とする。)	div / ※ 下記参照		○						
					○ Day 8 / Day 15					
5 パロセトロン注バッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 4 A	div / 15min			●					
6 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 4 A	div / 15min					●			
7 生食注 (50mL) ベンダムスチン塩酸塩注	1 瓶 _____ mg [90mg/m ²]	div(メイン) / 10min				○	○			
8 生食注 (50mL)	1 瓶	div(側管) / 10min ベンダムスチンと同時					●	●		
							CVポート投与の場合、生食注(50mL)は不要。			
9 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				
					● Day 8 / Day 15					

※ ガザイバ注 投与速度

初回投与 : 50mg/h (12.5mL/h) で開始し、30分毎に50mg/h (12.5mL/h) ずつ増量。最大400mg/h (100mL/h) まで。
2回目以降: 100mg/h (25mL/h) で開始し、30分毎に100mg/h (25mL/h) ずつ増量。最大400mg/h (100mL/h) まで。