

10N053_胆道_維持_(6週毎) KEY(1) + GC(1・8・22・29)

Pembrolizumab (Day 1) + GEM (Day 1・8・22・29) 6週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / 15min		●						
2 生食注 (100mL) キイトルーダ点滴静注	1 瓶 400 mg [400mg/body]	div(メイン) / 30min		○						
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / 15min		●						
4 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 4 A	div(メイン) / 15min		●			● Day 8 / Day 22 / Day 29			
5 生食注 (100mL) ゲムシタピン注	1 瓶 _____ mg [1000mg/m2]	div(メイン) / 30min		○			○ Day 8 / Day 22 / Day 29			
6 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●			● Day 8 / Day 22 / Day 29			

- ・ キイトルーダ注の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2~0.22 μ m)を使用すること。
- ・ キイトルーダ注の希釈後濃度は、1~10mg/mLとなること。