

23N031_卵巣_Bev + CBDCA + DOXIL 4週毎

Bevacizumab (Day 1・15) + CBDCA (Day 1) + DXR (Day 1) 4週毎 6コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 グラニセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注 235mg デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 1 瓶 3 A	div / 30min		●						
2 ブドウ糖注 5% (100mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
3 ブドウ糖注 5% (250mL) ドキシル注	1 袋 _____ mg [30mg/m2]	div / 1.5hr		○						
4 ブドウ糖注 5% (100mL)	1 瓶	div / 30min		●						
5 ブドウ糖注 5% (250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [AUC 5]	div / 1hr		○						
6 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●				● Day 15		
7 生食注 (100mL) ベバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____ mg [10mg/kg]	div / ※ 1.5hr		○				○ Day 15		
8 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●				● Day 15		

※ベバシズマブ注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。
 ※皮膚障害対策として、あらかじめ”手足症候群対応セット”をオーダーしてください。