

42N029_ICE

VP-16 (Day 1 - 3) + CBDCA (Day 2) + IFM (Day 2) 3週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 パロノセトロン注ハッグ0.75mg/50mL	1 袋	div / 30min		●						
2 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ				●				
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ			●	●				
4 テルモ生食 (500mL) ペブンド注	1 袋 _____ mg [100mg/m2]	div / 2hr		○	○	○				
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ				●				
6 テルモ生食 (500mL) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [AUC 5]	div / 2hr			○					
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ			●					
8 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ			●					
9 テルモ生食 (500mL) 注射用イホマイド ウロミテキサン注	1 袋 _____ mg [5g/m2] _____ mg [5g/m2]	div / 24hr			○					
10 ソルデム3A輸液 (500mL) メイロン静注8.4% (20mL)	1 袋 1 A	div / 4hr ★3~5回/日★				●	●			
11 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

- G-CSFを併用。
- ペブンド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。