

42N053_【初回】G-CHOP

Obinutuzumab (Day 1・8・15) + CPA (Day 1) + DXR (Day 1) + VCR (Day 1) + Prednisolone (Day 1 - 5) 3週毎 1コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 カロナール錠 200mg	3 Tab	po / ガザイバ投与30分前		●						
					● Day 8 / Day 15					
2 生食注 (100mL) ボララミン注5mg	1 瓶 1 A	div / 30min		●						
										プレドニゾロン錠を内服しない日にガザイバを投与する場合は デカドロン注1.65mgを4A混注する。
3 生食注 (100mL) ボララミン注5mg デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 1 A 4 A	div / 30min								● Day 8 / Day 15
4 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						● Day 8 / Day 15
5 生食注 (250mL) ガザイバ点滴静注	※ 1000 mg [1000mg/body] (全量 250mL とする。)	div / ※ 下記参照		○						○ Day 8 / Day 15
6 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						● Day 8 / Day 15
7 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 30min		●						
8 生食注 (50mL) オンコピン注射用	1 瓶 _____ mg [1.4mg/m ²] ※ Max 2.0mg/body	div / 15min		○						
9 生食注 (100mL) ドキシソルピシン塩酸塩注	1 瓶 _____ mg [50mg/m ²]	div / 30min		○						
10 ソルデム3A輸液 (500mL) 注射用エンドキサン	1 袋 _____ mg [750mg/m ²]	div / 3hr		○						
11 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
12 プレドニゾロン錠	_____ mg [100mg/body]	po		●	●	●	●	●		

※ ガザイバ注 投与速度

初回投与 : 50mg/h (12.5mL/h) で開始し、30分毎に50mg/h (12.5mL/h) ずつ増量。最大400mg/h (100mL/h) まで。

2回目以降 : 100mg/h (25mL/h) で開始し、30分毎に100mg/h (25mL/h) ずつ増量。最大400mg/h (100mL/h) まで。