

42N054_【2回目以降】G-CHOP

Obinutuzumab (Day 1) + CPA (Day 3) + DXR (Day 3) + VCR (Day 3) + Prednisolone (Day 3 - 7) 3週毎 7コース
 ※ 1-6コースはG-CHOP、7-8コースはGのみ3週毎に実施する。ただし、G-CVPは1-8コース実施する。

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 カロナール錠 200mg	3 Tab	po / ガザイバ投与30分前		●						
2 生食注 (100mL) ボラミン注5mg デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 1 A 4 A ※	div / 30min		●						
※ プレドニゾロン錠を内服する週はデカドロン注は不要。										
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
4 生食注 (250mL) ガザイバ点滴静注	※ 1000 mg [1000mg/body] (全量 250mL とする。)	div / ※ 下記参照		○						
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 30min				●				
7 生食注 (50mL) オンコピン注射用	1 瓶 _____ mg [1.4mg/m ²] ※ Max 2.0mg/body	div / 15min					○			
8 生食注 (100mL) ドキシルピシン塩酸塩注	1 瓶 _____ mg [50mg/m ²]	div / 30min					○			
9 ソルデム3A輸液 (500mL) 注射用エンドキサシ	1 袋 _____ mg [750mg/m ²]	div / 3hr					○			
10 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ					●			
11 プレドニゾロン錠	_____ mg [100mg/body]	po				●	●	●	●	●

※ ガザイバ注 投与速度

100mg/h (25mL/h) で開始し、その後、最大900mg/h (225mL/h) まで。