

## 42N041\_ABVD

VLB ( Day 1・15 ) + DXR ( Day 1・15 ) + BLM ( Day 1・15 ) + DTIC ( Day 1・15 ) + Methylprednisolone ( Day 1・15 ) 4週毎 6-8コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp.	商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1	パロセトロン注パッグ0.75mg/50mL	1 袋	div / 15min		●					● Day 15	
2	生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●					● Day 15	
3	生食注 ( 100mL ) ソル・メドロール静注用	1 瓶 40mg	div / 15min		●					● Day 15	
4	生食注 ( 50mL ) エクザール注射用	1 瓶 _____ mg [ 6mg/m <sup>2</sup> ]	div / 15min		○					○ Day 15	
5	生食注 ( 100mL ) ドキシソルピシン塩酸塩注	1 瓶 _____ mg [ 25mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○					○ Day 15	
6	生食注 ( 50mL ) ブレオ注射用	1 瓶 _____ mg [ 9mg/m <sup>2</sup> ] ※ Max 15mg/body	div / 15min		○					○ Day 15	
7	テルモ生食 ( 500mL ) ダカルバジン注用	1 袋 _____ mg [ 250-350mg/m <sup>2</sup> ]	div / 2hr		○					○ Day 15	
8	ソルデム3A輸液 ( 500mL ) メイロン静注8.4% ( 20mL ) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	div / 2.5hr		●					● Day 15	
9	ソルデム3A輸液 ( 500mL ) メイロン静注8.4% ( 20mL )	1 袋 2 A	div / 2.5hr		●					● Day 15	

- ・ブレオ注の総投与量上限は300mg/bodyとする。
- ・ダカルバジン注はルートを含め遮光すること。(血管痛防止のため。)
- ・Rp6およびRp7のhydration処方については省略することがある。
- ・1回目に嘔気が強かった人のみ、2回目からアプレピタントCapを追加。