

## 42N204\_HD-AraC + MIT ( 50才以下 ) [ 地固め療法 ]

Ara-C ( Day 1・3・5 ) + MIT ( Day 6 ) 3コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 バロネトロン注ハック0.75mg/50mL 1 袋		IVH サブ(青) / 30min		●				●		
2 生食注 ( 50mL )	1 瓶	IVH サブ(青) / フラッシュ		●				●		
3 生食注 ( 100mL ) ソル・メドロール 静注用	1 瓶 40mg	IVH サブ(青) / 30min ★2回/日★		●		●		●	●	
※ Day6 のみ1回/日										
4 ソルデム3A輸液 ( 500mL ) シタラビン注	※ _____ mg [ 3g/m2/回 ] ( ※全量 500mL とする。 )	IVH サブ(青) / 2hr		○ ×2		○ ×2		○ ×2		
※ 12時間毎に投与										
5 ソルデム3A輸液 ( 500mL ) メイロン 静注8.4% ( 20mL ) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	IVH サブ(青) / 2.5hr ★2回/日★		●		●		●	●	
※ Day6 のみ1回/日										
6 生食注 ( 100mL ) ノバントロン注	1 瓶 _____ mg [ 10mg/m2 ]	IVH サブ(青) / 30min								○
7 YDソリター-T1号 ( 500mL ) メイロン 静注8.4% ( 20mL )	1 袋 1 A	IVH メイン(白) / 12hr ★2回/日★		●	●	●	●	●	●	●

・シタラビン注の投与時はフルメトロン点眼液を使用。