

## 42N205\_HD-AraC + MIT ( 50-70才 ) [ 地固め療法 ]

Ara-C ( Day 1 - 5 ) + MIT ( Day 1・2 ) 3コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 パロセトロン注パッグ0.75mg/50mL 1 袋		IVH サブ(青) / 30min		●				●		
2 生食注 ( 50mL )	1 瓶	IVH サブ(青) / フラッシュ		●				●		
3 生食注 ( 100mL ) ソル・メドロール 静注用	1 瓶 40mg	IVH サブ(青) / 30min		●	●	●	●	●		
4 生食注 ( 100mL ) ノバントロン注	1 瓶 _____ mg [ 8mg/m <sup>2</sup> ]	IVH サブ(青) / 30min		○	○					
5 ソルデム3A輸液 ( 500mL ) シタラビン注	※ _____ mg [ 2g/m <sup>2</sup> ] ( ※全量 500mL とする。 )	IVH サブ(青) / 4hr		○	○	○	○	○		
6 ソルデム3A輸液 ( 500mL ) メイロン 静注8.4% ( 20mL ) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	IVH サブ(青) / 2.5hr		●	●	●	●	●		
7 YDソリター-T1号 ( 500mL ) メイロン 静注8.4% ( 20mL )	1 袋 1 A	IVH メイン(白) / 12hr ★2回/日★		●	●	●	●	●		

- 60-70才では、Ara.Cは最大50%減量可。
- シタラビン注の投与時はフルメトロン点眼液を使用。