

42N206_HD-AraC [地固め療法]

Ara-C (Day 1 - 5)

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 パロセトロン注ハッグ0.75mg/50mL 1 袋		IVH サブ(青) / 30min		●				●		
2 生食注 (50mL)	1 瓶	IVH サブ(青) / フラッシュ		●				●		
3 生食注 (100mL) ソレ・メドロール 静注用	1 瓶 40mg	IVH サブ(青) / 30min ★2回/日★		●	●	●	●	●		
4 ソルデム3A輸液 (500mL) シタラビン注	※ _____ mg [1-3g/m ² /回] (※全量 500mL とする。)	IVH サブ(青) / 3hr		○ ×2	○ ×2	○ ×2	○ ×2	○ ×2		
5 生食注 (50mL)	1 瓶	IVH サブ(青) / フラッシュ		● ×2	● ×2	● ×2	● ×2	● ×2		
6 ソルデム3A輸液 (500mL) メイロン静注8.4% (20mL) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	IVH サブ(青) / 2.5hr ★2回/日★		●	●	●	●	●		
7 YDソリター-T1号 (500mL) メイロン静注8.4% (20mL)	1 袋 1 A	IVH メイン(白) / 12hr ★2回/日★		●	●	●	●	●		

- ・シタラビン注のDay2,Day4は省略することがある。
- ・シタラビン注の投与時はフルメトロン点眼液を使用。