

## 42N216\_(高リスク 1週目)JALSG APL220 寛解導入

IDR ( Day 1 - 2 ) + ATO ( Day 5 - 7 ) + ATRA ( Day 1 - 7 ) 1コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 15min		●	●			●	●	●
2 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ						●	●	●
3 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) トリセノックス点滴静注	1 袋 _____ mg [ 0.15 mg/kg ]	div / 2hr						○	○	○
4 生食注 ( 100mL ) イダマイシン静注用	1 瓶 _____ mg [ ※ 12 mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○	○					
※ 70歳以上の場合は 8 mg/m <sup>2</sup>										
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●	●			●	●	●
6 ベサノイドCap	_____ mg [ 45 mg/m <sup>2</sup> ]	po / 分2 朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●
7 プレドニゾン錠	_____ mg [ 0.5 mg/kg ]	po								

● Day 1-14 まで投与し、その後、1週間かけて漸減して終了