

## 42N217\_JALSG APL220 地固め

ATO (Day 1-5 · 8-12 · 15-19 · 22-26) + ATRA (Day 1-14 · 29-42) 8週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

| Rp. 商品名                             | 用量 [ 基準量 ]                        | 投与方法         | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 グラニセトロン点滴3mgバッグ                   | 1 袋                               | div / 15min  |       | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |
| 2 生食注 ( 50mL )                      | 1 瓶                               | div / フラッシュ  |       | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |
| 3 ブドウ糖注 5% ( 250mL )<br>トリセノックス点滴静注 | 1 袋<br>_____ mg [ 0.15 mg/kg ]    | div / 2hr    |       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |
| 4 生食注 ( 50mL )                      | 1 瓶                               | div / フラッシュ  |       | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |
| 5 ベサノイドCap                          | _____ mg [ 45 mg/m <sup>2</sup> ] | po / 分2 朝夕食後 |       |   |   |   |   |   |   |   |

● Day 1-14 ・ Day 29-42