

## 10N045\_胃\_KEY+XELOX\_3週毎

Pembrolizumab(Day1) + L-OHP(Day1) + Capecitabine (Day1夕 - Day15 朝) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施・入院で実施 )

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
2	生食注(100mL) キイトルーダ点滴静注	1 瓶 200mg[200mg/body]	div / 30min		○						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
4	グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div / 15min		●						
5	ブドウ糖注5%(250mL) オキサリプラチン点滴静注液	1 袋 _____mg[130mg/m <sup>2</sup> ]	div / 2hr		○						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7	ゼローダ錠	_____mg/回 [1000mg/m <sup>2</sup> /回]  (1日 _____mg)	po								

● Day1 夕 - Day 15 朝 まで  
※添付文書の用法・用量のC法に準ずる。

※ 皮膚障害対策として、あらかじめ”手足症候群対応セット”をオーダーして下さい。

- ・ キイトルーダ注の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2~0.22 $\mu$ m)を使用すること。
- ・ キイトルーダ注の希釈後濃度は、1~10mg/mLとなること。