

10N053_胆道_維持_(6週毎)_KEY(1)+GC(1・8・22・29)

Pembrolizumab(Day1) + GEM(Day1・8・22・29) 6週毎

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / 15min		●						
2	生食注(100mL) キイトルーダ点滴静注	1 瓶 400mg[400mg/body]	div(メイン) / 30min		○						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / 15min		●						
4	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div(メイン) / 15min		●						
											● Day 8 / Day 22 / Day 29
5	生食注(100mL) ゲムシタピン注	1 瓶 _____mg[1000mg/m2]	div(メイン) / 30min		○						
											○ Day 8 / Day 22 / Day 29
6	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
											● Day 8 / Day 22 / Day 29

- ・ キイトルーダ注の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2~0.22 μ m)を使用すること。
- ・ キイトルーダ注の希釈後濃度は、1~10mg/mLとなること。