

10N057_乳_トロテルビ_3週毎

Sacituzumab Govitecan(Day1・8) 3週毎

◆ ____月 ____日(Day1)から ____コース実施。(外来で実施・入院で実施)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	カロナール錠200mg	3錠	po /トロテルビ投与30分前		●						
						● Day 8					
2	生食注(100mL) ボラミン注5mg ファモチジン注射液20mg デカドロン注射液1.65mg	1瓶 1A 1A 6A	div / 15min		●						
						● Day 8					
3	パロセトロン注バッグ0.75mg/50mL	1袋	div / 30min		●						
						● Day 8					
4	生食注(50mL)	1瓶	div / フラッシュ		●						
						● Day 8					
5	生食注(250ml)※1 トロテルビ点滴静注用	1袋 _____mg[10mg/kg]	div / 3hr ※2		○						
						○ Day 8					
6	生食注(50mL)	1瓶	div / フラッシュ		●						
						● Day 8					

※1 トロテルビ注投与量が275mg未満の場合は生食100mL、275～849mgの場合は生食250mL、850mg以上の場合は生食注500mLを用いる。

※2 トロテルビ注は忍容性良好であれば、初回(3hr)、2回目以降(1hr)で投与可。