

20N010_EP

VP-16(Day1-5) + CDDP(Day1-5) 3週毎 4コース

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	ソルデム3A輸液(500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
2	YDソリター-T1号(500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
3	YDソリター-T1号(500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
4	ソルデム3A輸液(500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr			●	●	●	●	●	
5	パロセトン注バッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1.65mg アロカリス点滴静注液235mg	1 袋 6 A 1 瓶	div(側管) / 30min		●						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div(側管) / フラッシュ		●						
7	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 5 A	div(側管) / 30min			●	●	●			
8	パロセトン注バッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div(側管) / 30min							●	
9	テルモ生食(500mL) ベプシド注	1 袋 _____mg[100mg/m ²]	div(側管) / 2hr		○	○	○	○	○		
10	生食注(50mL) フロセミド注射液20mg	1 瓶 1 A	div(側管) / 5min		●	●	●	●	●		
11	テルモ生食(500mL) シスプラチン注	1 袋 _____mg[20mg/m ²]	div(側管) / 2hr		○	○	○	○	○		
12	20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div(側管) / 1hr		●	●	●	●	●		

・ベプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。