

20N021_VIP

IFM(Day1-5) + CDDP(Day1-5) + VP-16(Day1-5) 3週毎

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施・入院で実施)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	パロセトロン注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 6 A	div(メイン) / 30min		●						
2	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
3	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 6 A	div(メイン) / 15min			●	●	●			
4	パロセトロン注バッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 6 A	div(メイン) / 15min						●		
5	生食注(100mL) ウロミテキサン注	1 瓶 _____mg[240mg/m2]	div(側管) / 30min イホマイド投与時		●	●	●	●	●		
6	テルモ生食(500mL) 注射用イホマイド	1 袋 _____mg[1200mg/m2]	div(メイン) / 2hr		○	○	○	○	○		
7	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●	●	●	●	●		
8	生食注(250mL) シスプラチン注	1 袋 _____mg[20mg/m2]	div(メイン) / 2hr		○	○	○	○	○		
9	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●	●	●	●	●		
10	生食注(100mL) ウロミテキサン注	1 瓶 _____mg[240mg/m2]	div(メイン) / 30min		●	●	●	●	●		
11	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●	●	●	●	●		
12	ブドウ糖注5%(500mL) ベプシド注	1 袋 _____mg[75mg/m2]	div(メイン) / 2hr		○	○	○	○	○		
13	ソリュージェンF注(500mL) メイロン静注8.4%(20mL)	1 袋 1 A	div(メイン) / 2hr		●	●	●	●	●		
14	ソルデム3A輸液(500mL) メイロン静注8.4%(20mL) ウロミテキサン注	1 袋 1 A _____mg[240mg/m2]	div(メイン) / 2hr		●	●	●	●	●		

・ベプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。