

23N018_子宮頸_TC + AVASTIN

CBDCA (Day1) + PTX 175mg/m² (Day1) + Bevacizumab (Day1) 3週毎

◆ ____月 ____日(Day1)から ____コース実施。(外来で実施・入院で実施)

◆アルコールに対する過敏症はありませんか? → (有・無)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg ポララミン注5mg ファモチジン注射液20mg	1 瓶 10 A 1 A 1 A	div / 15min		●						
2	グラニセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注235mg	1 袋 1 瓶	div / 30min		●						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
4	テルモ生食(500mL) パクリタキセル注	1 袋 _____mg[175mg/m ²]	div / 3hr		○						
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg[AUC 5]	div / 1hr		○						
7	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
8	生食注(100mL) アバスタチン点滴用	1 瓶 _____mg[15mg/kg]	div / ※ 1.5hr		○						
9	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※ アバスタチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。

パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。