

42N037_外来 G-Bendamustine

Obinutuzumab(Day1) + Bendamustine(Day1・2) 4週毎 6コース

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	コロナール錠200mg	3 錠	po/ ガザイバ投与30分前		●						
2	パロセロトン注バッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1.65mg ボララミン注5mg	1 袋 4 A 1 A	div / 15min		●						
3	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div / 15min			●					
4	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
5	生食注(250mL) ガザイバ点滴静注	※ 1000mg[1000mg/body] (全量 250mLとする。)	div / ※下記参照		○						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7	生食注(50mL) ベンダムスチン塩酸塩注	1 瓶 _____mg[90mg/m ²]	div(メイン) / 10min		○	○					
8	生食注(50mL)	1 瓶	div(側管) / 10min ベンダムスチンと同時		●	●					
9	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●					

CVポートの場合、Rp8の生食注(50mL)は不要。

※ ガザイバ注 投与速度

1コース目

初回投与 :50mg/h(12.5mL/h)で開始し、30分毎に50mg/h(12.5mL/h)ずつ増量。最大400mg/h(100mL/h)まで。

2回目以降:100mg/h(25mL/h)で開始し、30分毎に100mg/h(25mL/h)ずつ増量。最大400mg/h(100mL/h)まで。

2コース目以降

100mg/h(25mL/h)で開始し、その後、最大900mg/h(225mL/h)まで。