

## 42N039\_初回 G-Bendamustine 4週毎

Obinutuzumab(Day1・8・15) + Bendamustine(Day2・3) 4週毎

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	カロナール錠200mg	3 錠	po/ ガザイバ投与30分前		●						
						●	●				
											● Day 8 / Day 15
2	生食注(100mL) ポララミン注5mg デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 1 A 4 A	div / 30min		●						
											● Day 8 / Day 15
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
											● Day 8 / Day 15
4	生食注(250mL) ガザイバ点滴静注	※ 1000mg[1000mg/body] (全量 250mLとする。)	div / ※下記参照		○						
											○ Day 8 / Day 15
5	パロセロン注バッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1.65mg	1 袋 4 A	div / 15min			●					
6	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div / 15min					●			
7	生食注(50mL) ベンダムスチン塩酸塩注	1 瓶 _____mg[90mg/m <sup>2</sup> ]	div(メイン) / 10min				○	○			
8	生食注(50mL)	1 瓶	div(側管) / 10min ベンダムスチンと同時				●	●			
											CVポート投与の場合、Rp8の生食注(50mL)は不要。
9	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				
											● Day 8 / Day 15

※ ガザイバ注 投与速度

初回投与 : 50mg/h(12.5mL/h)で開始し、30分毎に50mg/h(12.5mL/h)ずつ増量。最大400mg/h(100mL/h)まで。  
2回目以降: 100mg/h(25mL/h)で開始し、30分毎に100mg/h(25mL/h)ずつ増量。最大400mg/h(100mL/h)まで。