

42N053_【初回】G-CHOP

Obinutuzumab(Day1・8・15) + CPA(Day1) + DXR(Day1) + VCR(Day1) + Prednisolone(Day1-5) 3週毎 1コース

◆ ____月 ____日(Day1)から ____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです!!

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	カロナール錠200mg	3錠	po /ガザイバ投与30分前		●						
2	生食注(100mL) ポララミン注5mg	1瓶 1A	div / 30min		○						
				● Day 8 / Day 15							
				プレドニゾロン錠を内服しない日にガザイバを投与 する場合は、デカドロン注1.65mgを4A混注する。							
3	生食注(100mL) ポララミン注5mg デカドロン注射液1.65mg	1瓶 1A 4A	div / 30min								
				● Day 8 / Day 15							
4	生食注(50mL)	1瓶	div / フラッシュ		●						
				● Day 8 / Day 15							
5	生食注(250mL) ガザイバ点滴静注	※ 1000mg[1000mg/body] (全量 250mLとする。)	div / ※下記参照		○						
				○ Day 8 / Day 15							
6	生食注(50mL)	1瓶	div / フラッシュ		●						
7	グラニセトロン点滴3mgバッグ	1袋	div / 30min		●						
8	生食注(50mL) オンコビン注射用	1瓶 ____mg[1.4mg/m2] ※Max 2.0mg/body	div / 15min		○						
9	生食注(100mL) ドキシルピシン塩酸塩注	1瓶 ____mg[50mg/m2]	div / 30min		○						
10	ソルデム3A輸液(500mL) 注射用エンドキサン	1袋 ____mg[750mg/m2]	div / 3hr		○						
11	生食注(50mL)	1瓶	div / フラッシュ		●						
12	プレドニゾロン錠	____mg[100mg/body]	po		●	●	●	●	●		

※ ガザイバ注 投与速度

初回投与: 50mg/h(12.5mL/h)で開始し、30分毎に50mg/h(12.5mL/h)ずつ増量。最大400mg/h(100mL/h)まで。
2回目以降: 100mg/h(25mL/h)で開始し、30分毎に100mg/h(25mL/h)ずつ増量。最大400mg/h(100mL/h)まで。