

42N054_【2回目以降】G-CHOP

Obinutuzumab(Day1) + CPA(Day2) + DXR(Day2) + VCR(Day2) + Prednisolone(Day2-6) 3週毎 7コース
 ※1-6コースはG-CHOP、7-8コースはGのみ3週毎に実施する。ただし、G-CVPは1-8コース実施する。

◆ ____月 ____日(Day1)から ____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです!!

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	カロナール錠200mg	3錠	po/ ガザイバ投与30分前		●						
2	生食注(100mL) ボラミン注5mg デカドロン注射液1.65mg	1瓶 1A 4A ※	div / 30min		●						
※プレドニゾン錠を内服する週はデカドロン注は不要。											
3	生食注(50mL)	1瓶	div / フラッシュ		●						
4	生食注(250mL) ガザイバ点滴静注	※ 1000mg[1000mg/body] (全量 250mLとする。)	div / ※下記参照		○						
5	生食注(50mL)	1瓶	div / フラッシュ		●						
6	グラニセトロン点滴3mgバッグ	1袋	div / 30min			●					
7	生食注(50mL) オンコビン注射用	1瓶 _____mg[1.4mg/m ²] ※Max 2.0mg/body	div / 15min			○					
8	生食注(100mL) ドキシソルピシン塩酸塩注	1瓶 _____mg[50mg/m ²]	div / 30min			○					
9	ソルデム3A輸液(500mL) 注射用エンドキサン	1袋 _____mg[750mg/m ²]	div / 3hr			○					
10	生食注(50mL)	1瓶	div / フラッシュ			●					
11	プレドニゾン錠	_____mg[100mg/body]	po			●	●	●	●	●	

※ガザイバ注 投与速度

100mg/h(25mL/h)で開始し、その後、最大900mg/h(225mL/h)まで。