

## 42N201\_IDR + AraC ( 40才未満 ) [ 寛解導入 ]

IDR(Day1-3) + Ara-C(Day1-10)

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです!!

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	パロセロトン注バッグ0.75mg/50mL	1 袋	div / 30min		●				●		
2	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ			●	●				
3	生食注(100mL) イダマイシン静注用	1 瓶 _____mg[12mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○	○	○				
4	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●	●	●	●	●
						● Day 8 / 9 / 10					
6	ソルデム3A輸液(500mL) シタラピン注	1 袋 _____mg[100mg/m <sup>2</sup> ]	div / 24hr		○	○	○	○	○	○	○
						○ Day 8 / 9 / 10					
7	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ								● Day 11

・必要時、デカドロン注を追加。