

42N205_HD-AraC + MIT (50-70才) [地固め療法]

Ara-C(Day1-5) + MIT(Day1・2) 3コース

◆ ____月 ____日(Day1)から ____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです!!

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	パロセロトン注バッグ0.75mg/50mL	1 袋	IVHサブ(青) / 30min		●				●		
2	生食注(50mL)	1 瓶	IVHサブ(青) / フラッシュ		●				●		
3	生食注(100mL) ソル・メドロール 静注用	1 瓶 40mg	IVHサブ(青) / 30min		●	●	●	●	●		
4	生食注(50mL)	1 瓶	IVHサブ(青) / フラッシュ		●	●	●	●	●		
5	生食注(100mL) ノバントロン注	1 瓶 ____mg[8mg/m ²]	IVHサブ(青) / 30min		○	○					
6	ソルデム3A輸液(500mL) シタラビン注	※ ____mg[2g/m ²] (※全量500mLとする。)	IVHサブ(青) / 4hr		○	○	○	○	○		
7	生食注(50mL)	1 瓶	IVHサブ(青) / フラッシュ		●	●	●	●	●		
8	ソルデム3A輸液(500mL) メイロン 静注8.4%(20mL) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	IVHサブ(青) / 2.5hr		●	●	●	●	●		
9	ソリター-T1号(500mL) メイロン 静注8.4%(20mL)	1 袋 1 A	IVHメイン(白) / 12hr ★ 2回/日 ★		●	●	●	●	●		

- ・60-70才では、Ara-Cは最大50%減量可。
- ・シタラビン注の投与時はフルメトロン点眼液を使用。