

42N210_A + triple V [地固め療法]

VP-16(Day1-5) + Ara-C(Day1-5) + VCR(Day8) + VDS(Day10)

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	パロセロン注バッグ0.75mg/50mL	1 袋	div / 30min		●				●		
2	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ			●	●	●			
3	テルモ生食(500mL) バプシド注	1 袋 _____mg[100mg/m ²]	div / 1~2hr		○	○	○	○	○		
4	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●	●	●		
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6	ソルデム3A輸液(500mL) シタラピン注	1 袋 _____mg[200mg/m ²]	div / 24hr		○	○	○	○	○		
7	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●	●	●	●	
8	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ								
9	生食注(50mL) オンコビン注射用	1 瓶 _____mg[0.8mg/m ²]	div / 15min								
10	生食注(50mL) 注射用フィルデシン	1 瓶 _____mg[2mg/m ²]	div / 15min								
11	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ								

- ・ 必要時、デカドロン注を追加。
- ・ バプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。