

## 42N402\_LSG15 ( VCAP-AMP-VECP )

VCR(Day1) + DXR(Day1・8) + CPA(Day1) + MCNU(Day8) + VDS(Day15) + VP-16(Day15・16・17) + CBDCA(Day15) + Prednisolone(Day1・8・15・16・17) 4週毎 6コース

◆ \_\_\_\_月 \_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_コース実施。( 外来で実施・入院で実施 )

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	パロセロリン注バッグ0.75mg/50mL	1 袋	div / 30min		●						
						● Day 8 / ● Day 15					
2	生食注(50mL) オンコピン注射用	1 瓶 _____mg[1mg/m2] ※Max2.0mg/body	div / 15min		○						
3	生食注(100mL) ドキシソルピシン塩酸塩注	1 瓶 _____mg[40mg/m2]	div / 30min		○						
4	ソルデム3A輸液(500mL) 注射用エンドキサン	1 袋 _____mg[350mg/m2]	div / 2hr		○						
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6	生食注(100mL) ドキシソルピシン塩酸塩注	1 瓶 _____mg[30mg/m2]	div / 30min							○ Day 8	
7	生食注(100mL) 注射用サイメリン	1 瓶 _____mg[60mg/m2]	div / 30min							○ Day 8	
8	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ							● Day 8	
9	生食注(50mL) 注射用フィルデシン注	1 瓶 _____mg[2.4mg/m2] ※Max3.0mg/body	div / 15min							○ Day 15	
10	テルモ生食(500mL) ベプシド注	1 袋 _____mg[100mg/m2]	div / 2hr							○ Day 15 / 16 / 17	
11	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg[250mg/m2]	div / 1hr							○ Day 15	
12	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ							● Day 15 / 16 / 17	
13	プレドニゾロン錠	_____mg[40mg/m2]	po		●					● Day 8 / 15 / 16 / 17	

- ・ 必要時、補液を追加。
- ・ ベプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。