







(1クール目) ライブリバント+ラズクルーズ

+ 大津赤十字病院 薬剤部

【治療スケジュール】

以下のメニューのおくすりを4週間毎繰り返します。

薬剤名	外観	液色	薬効	1クール									
				第1日目	2日	3~7日	8日	9~14日	15日	16~21日	22日	23~28日	
① デカドロン注		無色	お薬の過敏症を抑えます。	↓	15分・点滴	↓	お休み	お休み	お休み	お休み	お休み	お休み	
② アセリオ注 ポララミン注		無色	お薬の過敏症を抑えます。	↓	15分・点滴	↓		↓		↓			↓
③ 生食注		無色	お薬を洗い流します。	↓	30分・点滴	↓		↓		↓			↓
④ ライブリバント注 [®] (アミバンタマブ)		無色	細胞増殖を抑えます。	↓	4時間・点滴	↓		↓		↓			↓
⑤ 生食注		無色	お薬を洗い流します。	↓	全開・点滴	↓		↓		↓			↓
ラズクルーズ錠 [®]			細胞増殖を抑えます。	1日1回 28日間・内服									


※お薬の投与速度・投与間隔が変わることがあります。また、症状に応じてお薬を変更・追加・削除することがあります。

【注意事項】

点滴中は安静にし、注射の針を刺している部分が動かないように心掛けてください。
 お薬が皮膚に漏れると、針を刺している部分に違和感や痛み、腫れ、赤み等が現れることがあります。
 このような症状がありましたら速やかにお知らせください。
 抗アレルギー薬を含むので眠気やふらつき、転倒にご注意ください。
 点滴日のお車の運転はお控えください。
 ラズクルーズとの併用により、静脈血栓塞栓症のリスクがあります。下肢の疼痛、浮腫、突然の息切れ、胸痛があれば速やかに受診してください。

【副作用と発現時期】

ここにはあくまで一般的に予想される副作用が、いつごろ現れるかをお示ししています。これらの症状が必ず起こるということではありません。発現頻度・程度・時期には個人差があります。また、これら以外の副作用が現れることもありますので、症状が現れた時はお知らせください。



【注意が必要な副作用】

頻度は高くありませんが、次に示すような副作用が報告されています。下記の症状が現れた時は医師または薬剤師へお知らせください。

- 骨髄抑制 : ★38℃以上の発熱、咳、下痢、排尿痛・残尿感、性器痛、肛門痛、鼻血、血便・血尿、歯茎出血、腕や足の赤い斑点、疲れやすい、めまい・息切れ
- 過敏症 : ★呼吸困難、じん麻疹、眼および口の周囲の腫れ、冷汗、頻脈
- 消化器症状 : ★突然の激しい腹痛、背部痛、重度の下痢、脱水症状、もたれ、胸やけ、吐き気、嘔吐、食欲不振
- 下痢・脱水 : ★口の渇き、手足のふるえ、過呼吸、重度の下痢、意識障害(時に昏睡)
- 心障害 : ★呼吸困難、足などのむくみ、咳の増加、胸痛、みぞおちや頸部の締め付け、圧迫感、冷汗
- 肝障害 : ★全身倦怠感、食欲不振、疲れやすい、腹部不快感、黄疸(皮膚や眼などが黄色くなる)
- 皮膚障害 : ★中央に浮腫を伴った発疹、まぶた・眼球結膜の充血、口腔内の痛みを伴った粘膜疹
- 肺障害 : ★胸痛、意識障害、呼吸困難、(空)咳、発汗、発熱、ピンク色の痰がでる、尿量減少、むくみ
- 血栓 : ★意識を失いそうになる、身体の麻痺、ろれつがまわらなくなる、激しいめまい、胸が痛んだり締め付けられるような感じ、足がむくんだり痛みが出る、突然の息切れ
- 眼障害 : ★ドライアイ、角膜炎、充血、視力障害

連絡先 大津赤十字病院

TEL 077-522-4131

平日8:30 ~ 17:00 受診されている診療科

平日17:00 ~ 翌8:30 及び休日 救急外来